

# 令和4年度 新ひだか町予防接種

【令和4.4.1改正】

※月齢(年齢)は接種日現在


種類	予防接種名	対象月(年齢)	接種回数	接種間隔など	料金
生ワクチン	ロタウイルス	1価 6から24週まで	2回	① 27日以上 初回接種は14週6日まで → ② 24週(5か月半)まで	※ワクチンは2種類あります。同一のワクチンで接種を完了する必要があります。
		5価 6から32週まで	3回	① 27日以上 初回接種は14週6日まで → ② 27日以上 → ③ 32週(7か月半)まで	
	BCG	1歳未満	1回	標準的な接種時期は、生後5か月～8か月未満	
	麻しん風しん混合	第1期 1～2歳未満 第2期 年長児相当	各1回		
	水痘	1～3歳未満	2回	3か月以上 ① → ② ※1回目の標準接種期間は、12か月～15か月まで 標準：6～12か月間隔	
不活化ワクチン	小児用肺炎球菌	2か月～5歳未満	1～4回	接種開始が2～7か月未満の場合…4回 <注1> 12か月以降で、27日以上 27日以上 ③から60日以上 ① → ② → ③ → ④ 4回目標準：12～15か月 接種開始が7～12か月未満の場合…3回 <注2> 12か月以降で、27日以上 ②から60日以上 ① → ② → ③ 3回目標準：12～15か月 接種開始が1～2歳未満の場合…2回 60日以上 ① → ② 接種開始が2～5歳未満の場合…1回 1回で終了です	無料
	ヒブ	2か月～5歳未満	1～4回	接種開始が2～7か月未満の場合…4回 <注3> 27日以上 27日以上 7か月以上 ① → ② → ③ → ④ 標準：27～56日間隔 標準：27～56日間隔 標準：7～13か月間隔 接種開始が7～12か月未満の場合…3回 <注4> 27日以上 7か月以上 ③ ① → ② → ③ 標準：27～56日間隔 標準：7～13か月間隔 接種開始が1～5歳未満の場合…1回 1回で終了です	
	B型肝炎	1歳未満	3回	① 27日以上 → ② ②から6日以上。かつ、①から139日以上(20週間) → ③ ※3回目までの標準接種期間は、2～9か月まで	
	四種混合 (ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ)	3か月～7歳6か月未満	第1期初回3回 第1期追加1回	第1期初回 ① 20日以上 → ② 20日以上 → ③ 6か月以上 → ④ 第1期追加 標準：20～56日間隔 標準：20～56日間隔 標準：12～18か月間隔	
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11～13歳未満	1回	※二種混合は、四種混合の追加2期として(ジフテリア・破傷風)接種	
日本脳炎	第1期 6か月～7歳6か月未満 (標準は3歳から) 第2期 9～13歳未満	初回 2回 追加 1回 1回	第1期初回 ① 6日以上 → ② 6か月以上 → ③ 1期追加 → ④ 2期 標準：6～28日間隔 標準：概ね1年以上 概ね1期追加から5年の間隔が望ましい	経過措置の対象の方 ①H19.4.2～H21.10.1で9歳から13歳未満の方 ②H7.4.2～H19.4.1で20歳未満の方 詳細は裏面	
子宮頸がん (HPV感染症)	小学6年～ 高校1年生 相当の女子	3回	2価ワクチン (サーバリックス) ① 1か月以上 → ② ①の接種から6か月以上 → ③ 4価ワクチン (ガーダシル) ① 2か月以上 → ② ①の接種から6か月以上 → ③ 4回) 2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。	<左記の間隔で接種できない場合> 2価) 2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上あけます。	

★★★ 接種前に、各医療機関に予約してください ★★★

個別接種協力医療機関	ロタ	BCG	麻しん風しん	水痘	肺炎球菌	ヒブ	B型肝炎	四種混合	二種混合	日本脳炎	子宮頸がん	三種混合	不活化ポリオ
町立静内病院 TEL 42-0181	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三石国民健康保険病院 TEL 33-2231	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日高徳洲会病院 TEL 42-0701	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
山田クリニック TEL 43-0008	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中村脳神経内科 クリニック TEL 43-0911	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
駒木クリニック TEL 45-0123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
仲川内科胃腸科医院 TEL 42-0345	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※5価のロタウイルスワクチンも希望により実施(要予約)

## 接種間隔について



※接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹などの症状が出ることがあります。  
※規定上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や接種部位の腫脹がないことなど、体調に問題がないことを確認してから接種してください。

※同一のワクチンを複数回接種する場合の間隔は左表参照

◆対象月齢の考え方◆  
生後○か月、○歳一国の対象年齢の解釈に基づき、対象日の前日から接種可能となります。例)R4.5.1生まれの場合、2か月から⇒R4.6.30から、1歳から⇒R5.4.30から

★★★お問合せ先★★★  
新ひだか町保健福祉センター TEL 0146-42-1287

\*接種の際は予防票と母子手帳を忘れずにお持ちください (接種日に新ひだか町から転出している場合や接種期限を超えての接種は有料となりますのでご注意ください)

\*上記のほかの定期予防接種や任意の予防接種(有料)は裏面参照。